

Prunellier, écrit aussi prunelier (*Prunus spinosa*)

arbuste de la famille des Rosaceae. Il est aussi appelé « buisson noir », « épinette » ou « épine noire ».

En raison de son caractère épineux et d'une forte tendance à drageonner, il a été très utilisé pour former des haies défensives (comme l'aubépine) peut former une haie ou un taillis inextricable en quelques années. Ses fruits étant appréciés des oiseaux qui disséminent ses graines, il est souvent une espèce envahissante des friches et de certaines pâtures.



Organes reproducteurs

Couleur dominante des fleurs : blanc

Période de floraison : mars-mai

Inflorescence : fleurs solitaires ou groupées en petits bouquets

Sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame

Graine

Fruit : drupe

Dissémination : endozoochore

Habitat et répartition

Habitat type : fourrés arbustifs médioeuropéens (fourré littoral à prunellier), planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Aire de répartition : eurasiatique

Le prunellier peut mesurer de 2 à 6 mètres de haut. Ses branches épineuses portent des petites fleurs blanches très mellifères au mois de mars ou avril selon le climat. Ses baies (des baies à un seul noyau appelées "prunelles, localement plosses") violettes sont astringentes et très âpres tant qu'elles n'ont pas subi les premières gelées.

Il existe différents cultivars du prunellier dont le *Prunus spinosa* 'Plena' qui dispose de fleurs doubles.

